



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL BEICO *KEMIKAR T* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2015 m. balandžio 24 d. Nr. A1-279

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į *Kemikar T* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL, 2008 L 353, p.1) išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u beičą *Kemikar T*, Chemtura Europe Limited, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: karboksinas 200 g/l + tiramas 200 g/l.

Beico forma: skystas koncentratas.

Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra tiramo ir karboksino. Gali sukelti alerginę reakciją.

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neįkvėpti rūko/ garų/ aerozolių.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus, būtina beicuotas sėklas visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti visišką įterpimą vagų gale.

Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus, pašalinti pabirusias beicuotas sėklas.

Pakuotė: 20 l

Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams.

Norma: 2,5–3,0 l/t

Saugo nuo kietųjų kūlių, helmintosporiozinio ir fuzariozinio šaknų puvinų, daigų septoriozės, pelėsinių grybų

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 10 litrų tirpalo.

Žieminiams rugiams, kvietrugiams.

Norma: 2,0–2,5 l/t

Saugo nuo stiebinių kūlių, helmintosporiozinio ir fuzariozinio šaknų puvinų, alternariozės, skalsių, pelėsinių grybų

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 10 litrų tirpalo.

Vasariniams kviečiams, miežiams, kvietrugiams

Norma: 2,0–2,5 l/t

Saugo nuo kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, helmintosporiozinio ir fuzariozinio šaknų puvinų, daigų septoriozės, pelėsinių grybų, pristabdomas ankstyvas miltligės plitimas.

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 10 litrų tirpalo.

Linams.

Norma: 1,5–2,0 l/t

Saugo nuo antraknozės, šlakuotumo

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 3-5 l/t tirpalo.

Lubinams.

Norma: 1,75–2,0 l/t

Saugo nuo antraknozės, fuzariozės

Beicuoti naudojant 1 tonai sėklų 10 l/t tirpalo.

Direktorius

Sergejus Fedotovas