



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO SYLLIT 544 SC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. sausio 22 d. Nr. A1-28

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Syllit 544 SC* registracijos ataskaitos išvadamis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Syllit 544 SC*, Agriphar S. A., profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

Veiklioji medžiaga: dodinas 544 g/l.

Fungicido forma: koncentruota suspensija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas prarijus ir įkvėpus.

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių apsaugos priemones.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l polietileno tereftalato (PET) ir didelio tankio polietileno (DTPE) buteliai; 5 l PET ir DTPE konteineriai.

Fungicidas naudojamas:

Obelims, kriaušėms.

Saugo nuo rauplių.

Norma: 1,25 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Vyšnioms, trešnėms.

Saugo nuo kokomikozės.

Norma: 1,25 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne vėliau kaip 14 dienų.

Direktorius

Sergejus Fedotovas