



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-343  
„DĖL HERBICIDO *STOMP CS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 5 d. Nr. A1-293  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. A1-343 „Dėl herbicido *Stomp CS* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *STOMP CS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), *Stomp CS* registracijos ataskaitos išvados ir atsižvelgdamas į *Stomp CS* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Stomp CS*, *BASF A/S*, profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. liepos 31 d.

Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 455 g/l

Herbicido forma: kapsulinė suspensija

Herbidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra pendimetalino. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l

Herbicidas naudojamas:

Kukurūzams.

Norma: 2,9 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po kukurūzų sėjos iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14) ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams ir žirnių ir javų mišiniams.

Norma: 2,9 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos prieš žirnių ir žirnių ir javų mišinių sudygimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Pupoms.

Norma: 2,9 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos prieš pupų sudygimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams su dobilų, liucernos arba varpinių žolių įsėliais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0 – 2,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucerna, ne daugiau kaip 1 kartą.

Dobilų, liucernos arba varpinių žolių pasėliams.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0 – 2,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucerna, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams su raudonųjų dobilų įsėliais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 2,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai turi 1–2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams su liucernos, baltųjų dobilų įsėliais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0–2,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai liucerna ar dobilai turi 1–2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudoniesiems, baltiesiems dobilams, liucernai sėklai sėjos metais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0–2,0 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti anksti pavasarį, kai piktžolės turi 1–2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 2,9–4,35 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po paskutinio kaupimo, akėjimo ne vėliau kaip 7 dienos iki bulvių sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, česnakams, auginamiems iš sėklų.

Norma: 2,18–3,6 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos prieš sudygimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, česnakams, sodinamiems iš sėklinių ropelių.

Norma: 2,18–3,6 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti prieš ropelių išsodinimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Porams, auginamiems iš sėklų.

Norma: 2,9 l/ha

Naikina vienametės dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos iki sudygimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Morkoms, šakninėms petražolėms.

Norma: 2,9 l/ha

Naikina vienametės dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos iki sudygimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Gūžiniams kopūstams.

Norma: 2,18–3,6 l/ha

Naikina vienametės dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti prieš kopūstų daigų išsodinimą ne daugiau kaip 1 kartą.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas