



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL HERBICIDO *FENIX* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. A1-294
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Fenix* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Fenix*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.

Veiklioji medžiaga: aklonifenas 600 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra aklonifeno. Gali sukelti alerginę reakciją.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis, kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną, kai naudojimo norma yra 3,0 l/ha arba 2,5 l/ha, ir 10 metrų apsaugos zoną, kai naudojimo norma yra 2,0 l/ha arba purškama 2 kartus (1,5 l/ha + 1,0 l/ha), iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l.

Herbicidas naudojamas:

Bulvėms.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 2,5–3,0 l/ha.

Purkšti po galutinio vagų suformavimo (paskutinio bulvių kaupimo), ne vėliau kaip 1 savaitė iki bulvių daigų pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams, pupoms.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 3,0 l/ha.

Purkšti po sėjos, iki žirnių ar pupų sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Morkoms, pastarnokams, šakninėms petražolėms.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 2,5 l/ha.

Purkšti iki morkų, pastarnokų, šakninių petražolių sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą arba per du kartus: pirmą kartą 1,5 l/ha iki morkų, pastarnokų, šakninių petražolių sudygimo, antrą kartą 1,0 l/ha, kai morkos, pastarnokai, šakninės petražolės turi 2 tikruosius lapelius, o piktžolės yra skilčialapių tarpsnio.

Svogūnams, auginamiems iš ropelių, česnakams.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 2,5 l/ha.

Purkšti iki svogūnų, česnakų sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą arba per du kartus: pirmą kartą 1,5 l/ha pasodinus svogūnus, česnakus iki sudygimo, antrą kartą 1,0 l/ha, kai svogūnai, česnakai turi 1–2 lapelius, o piktžolės yra skilčialapių tarpsnio.

Kmynams.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 2,0 l/ha.

Purkšti po sėjos iki kmynų sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Lapinėms petražolėms.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 2,5 l/ha.

Purkšti po sėjos iki lapinių petražolių sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Krapams.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Purkšti po sėjos iki krapų sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Saulėgražoms.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 2,5–3,0 l/ha.

Purkšti po sėjos, bet ne vėliau kaip savaitė iki saulėgražų sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Miško sodinukams (eglėms, pušims, kėniams, maumedžiams), daigynams.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Purkšti augalų ramybės periodu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Gluosninių šeimos augalams.

Naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Norma: 1,5–2,5 l/ha.

Purkšti po pasodinimo prieš naujų ūglių formavimąsi, ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas