



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.
KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-074 „DĖL HERBICIDO *ETHOSAT 500 SC*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKĖITIMO**

2015 m. gegužės 5 d. Nr. A1-295
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. A1-074 „Dėl herbicido *Ethosat 500 SC* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ETHOSAT 500 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. vasario 23 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Ethosat 500 SC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Ethosat 500 SC*, *ADAMA Registrations B.V.*, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: etofumezatas 500 g/l

Herbicido forma: koncentruota suspensija

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti *Ethosat*[®] 500 SC ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra etofumesato, daugiau kaip 1,0 kg etofumesato/ha per sezoną ar 2,0 kg/ha per trijų auginimo sezonų laikotarpį.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l

Herbicidas naudojamas:

Cukriniam ir pašariniams runkeliams.

Naikina vienametes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Pasėlius purškti per 3 kartus, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo stadijos: pirmą kartą – *Ethosat 500 SC* 0,4 l/ha + *Kontakt 320 SC* 0,5 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,0 l/ha, antrą kartą – *Ethosat 500 SC* 0,4 l/ha + *Kontakt 320 SC* 0,5 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,0 l/ha, trečią kartą – *Ethosat 500 SC* 0,4 l/ha + *Kontakt 320 SC* 0,5 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,0 l/ha.

Pasėlius purškti per 2 kartus: pirmą kartą, kai piktžolės yra iki 4 tikrųjų lapelių augimo tarpsnio (runkeliai mažiausiai – 2 lapelių augimo tarpsnyje) – *Ethosat 500 SC* 0,4 l/ha + *Kontakt 320 SC* 0,75 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,5 l/ha, antrą kartą po 5–10 dienų po pirmojo purškimo – *Ethosat 500 SC* 0,4 l/ha + *Kontakt 320 SC* 0,75 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,5 l/ha.

Pasėlius purškti per 3 kartus, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo stadijos: pirmą kartą – *Kontakt 320 SC* 0,75 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,5 l/ha, antrą kartą – *Kontakt 320 SC* 0,75 l/ha + *Goltix 700 SC* 1,5 l/ha, trečią kartą – *Ethosat 500 SC* 0,8 l/ha + *Kontakt 320 SC* 1,0 l/ha.

Purškti ne daugiau kaip 3 kartus.“