



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.  
BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. A1-108 „DĖL HERBICIDO *STOMP 330 EC*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2015 m. gegužės 5 d. Nr. A1-297  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. A1-108 „Dėl herbicido *Stomp 330 EC* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *STOMP 330 EC* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. gegužės 7 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Stomp 330 EC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Stomp 330 EC*, *BASF A/S*, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 330 g/l

Herbicido forma: koncentruota emulsija

Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Sudėtyje yra pendimetalino. Gali sukelti alerginę reakciją.

Kenksminga prarijus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Dirgina odą.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės, kai purškama prieš sudygstant augalams, ir 1 metro, kai purškama po augalų sudygimo.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.

Norma: 4,0–5,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti rudenį, javams turint 1–3 lapelius ir ne vėliau kaip piktžolėms turi 2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Kukurūzams.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po kukurūzų sėjos–iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14) ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams ir žirnių–javų mišiniams.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti prieš žirnių ir mišinių sudygimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Pupoms.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti prieš pupų sudygimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Dobilų / liucernos / varpinių žolių pasėliams ir jų įsėliui vasariniuose kviečiuose arba vasariniuose miežiuose.

Norma: 2,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai ankštinės žolės ką tik sudygusios, mišiniuose su 1,0–2,0 l/ha *Basagran 480* ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudonųjų dobilų įsėliams su vasarinių kviečių arba vasarinių miežių antsėliais.

Norma: 1,0–2,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai turi 1–2 lapelius mišiniuose su 2,0 l/ha *Basagran 480* ne daugiau kaip 1 kartą.

Liucernos / baltųjų dobilų įsėliams su vasarinių kviečių arba vasarinių miežių antsėliais.

Norma: 2,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai liucerna ar dobilai turi 1–2 lapelius mišiniuose su 1,0–2,0 l/ha *Basagran 480* ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudoniesiems ir baltiesiems dobilams bei liucernai sėklai sėjos metais.

Norma: 2,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti anksti pavasarį, kai piktžolės turi 1–2 lapelius mišiniuose su 1,0–2,0 l/ha *Basagran* 480 ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 4,0–6,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po paskutinio kaupimo akėjimo prieš bulvių sudygimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, česnakams.

Norma: 3,0–5,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti sėjant iš sėklų – tuoj po sėjos prieš sudygimą, sodinant ropelėmis – prieš ropelių išsodinimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Porams.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos prieš sudygimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Morkoms, šakninėms petražolėms.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti prieš morkų ir šakninių petražolių sudygimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Kopūstams.

Norma: 3,0–5,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti prieš kopūstų daigų išsodinimą į lauką ne daugiau kaip 1 kartą.“