



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *CUADRO 25 EC* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2013 m. rugsėjo 11 d. Nr. A1-304
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127) ir *Cuadro* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u augimo reguliatorių *Cuadro 25 EC*, Cheminova A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. balandžio 30 d.

Veiklioji medžiaga: trineksapak etilas 250 g/l.

Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Atsargiai.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 5 l.

Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Saugo nuo išgulimo.

Norma: 0,2–0,4 l/ha.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams.

Saugo nuo išgulimo.

Norma: 0,2–0,3 l/ha.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Saugo nuo išgulimo.

Norma: 0,4–0,6 l/ha.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams rugiams, kvietrugiams.

Saugo nuo išgulimo.

Norma: 0,4–0,6 l/ha.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Gausiažiedėms bei daugiametėms svidrėms.

Saugo nuo išgulimo.

Norma: 0,4–0,8 l/ha.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žiedyno susidarymo (BBCH 30–49), ne daugiau kaip 1 kartą.

Nendriniam ir raudoniesiems eraičinams.

Saugo nuo išgulimo.

Norma: 0,8 l/ha.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žiedyno susidarymo (BBCH 30–49), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pašariniams motiejukams, šunažolėms.

Saugo nuo išgulimo.

Norma: 0,5–0,8 l/ha.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žiedyno susidarymo (BBCH 30–49), ne daugiau kaip 1 kartą.