



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO-AKARICIDO *FIBRO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2013 m. rugsėjo 12 d. Nr. A1-307

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Fibro* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u insekticidą-akaricidą *Fibro*, Belchim Crop Protection NV, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l.

Insekticidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu arba jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių, purškiant sodus.

Siekiant apsaugoti dirvos organizmus, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra parafino aliejaus, daugiau kaip 8 kartus per sezoną ir dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke, purškiant bulves.

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo ir bičių aktyvaus maitinimosi metu.

Pakuotė: 5 l, 20 l.

Insekticidas naudojamas:

Bulvėms.

Naikina amarus, kaip virusų pernešėjus.

Norma: 10 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 8 kartus.

Obelims, kriaušėms, vyšnioms, slyvoms.

Naikina rausvąsias sodines erkes.

Norma: 20–30 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Kriaušėms.

Naikina kriaušines blakutes.

Norma: 20–30 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: jei purškama 2 kartus, naudoti 20 l/ha normą.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas