



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *JUVENTUS 90* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2011 m. spalio 6 d. Nr. A1- 314
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. rugsėjo 16 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis,

perregistruoju fungicidą *Juventus 90*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. gegužės 31 d.

Veiklioji medžiaga: metkonazolas 90 g/kg.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Dirgina kvėpavimo takus.

Gali pakenkti negimusiam vaikui

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti garų, aerozolių.

Vengti patekimo į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, geltonųjų rūdžių.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, miežių septoriozės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,7 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo puvinio, fomezės.

Norma: 0,5-0,7 l/ha naudoti kaip augimo reguliatorių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,5 - 0,7 l/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo puvinio arba naudoti kaip augimo reguliatorių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

Direktorius

Evaldas Zigmantas Čijauskas