



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *LIBRAX (BAS 712F)* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. gegužės 11 d. Nr. A1-320

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Librax (BAS 712 F)* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Librax (BAS 712 F)*, BASF A/S profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: fluksapiroksadas 62,5 g/l + metkonazolas 45 g/l.

Fungicido forma: koncentruota emulsija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro - iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69) ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti žydėjimo metu (BBCH 61–69) ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69) ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti žydėjimo metu (BBCH 61–69) ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69) ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams miežiams.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, ramuliarijos, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69) ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Vasariniams miežiams.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, tinkliškosios dryžligės, ramuliarijos, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69) ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Avižoms.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo avižų dryžligės.

Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69) ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Direktorius

Sergejus Fedotovas