



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *CYCOCEL 750* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. gegužės 25 d. Nr. A1-324
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Cycocel 750* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u augimo reguliatoriaus *Cycocel 750*, BASF A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. lapkričio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 750 g/l.

1.2. Augimo reguliatoriaus forma: vandenyje tirpus koncentratas.

1.3. Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas susilietus su oda.

Kenksmingas prarijus.

Gali ėsdinti metalus.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 10 l.

1.5. Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,8–1,25 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Didesnę normą naudokite aukštaūgėms rugių veislėms ir gerai įtręštiems, daug maisto medžiagų turintiems dirvožemiams, mažesnę normą naudokite lengvoms, mažai tręštomis dirvoms ir žemaūgėms rugių veislėms.

Vasariniams miežiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha.

Pagerina krūmijimąsi ir šaknijimąsi.

Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25-32) ne daugiau kaip 1 kartą.

Avižoms.

Norma: 1,0 – 1,5 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–37) ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudoniesiems eraičinams (*Festuca rubra*).

Norma: 1,2 – 2,0 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti krūmijimosi viduryje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32) ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas