



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M. LIEPOS
21 D. ĮSAKYMO NR. A1-145 „DĖL FUNGICIDO *ROVRAL AQUA FLO* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 12 d. Nr. A1-325
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. A1-145 „Dėl fungicido *Rovral Aqua Flo* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *ROVRAL AQUA FLO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. birželio 19 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis, Konsultavimo komisijos 2009 m. vasario 12 d. protokole Nr. AS1-1 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Rovral Aqua Flo* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Rovral Aqua Flo*, BASF A/S profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: iprodionas 500 g/l

Fungicido forma: vandeninė koncentruota suspensija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 50 l, 200 l, 1000 l

Fungicidas naudojamas:

Žirniams.

Norma: 1,0 l/ha

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.

Briuseliniam kopūstams.

Norma: 1,0 l/ha

Saugo nuo juodosios dėmėtligės (alternariozės).

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.

Braškėms.

Norma: 1,5 l/ha

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.

Avietėms.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.

Fungicidas naudojamas kaip beicas:

Žieminių ir vasarinių rapsų, kopūstų sėkloms beicuoti.

Norma: 500 ml/100 kg sėklų

Saugo ankstyvuosiuose tarpsniuose nuo juodosios dėmėtligės, fomezės.

Sėklas beicuoti neskiestu fungicidu arba atskiesti atsižvelgiant į beicavimo mašinos technines charakteristikas.

Bulvėms beicuoti.

Norma: 20 ml/ 100 kg bulvių

Saugo nuo rizoktoniozės.

Gumbus beicuoti naudojant ne daugiau kaip 200 ml tirpalo 100 kg bulvių.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas