



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO MYSTIC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2011 m. vasario 14 d. Nr. A1-33
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. vasario 1 d. protokole Nr. AS1-1 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą Mystic, Nufarm GmbH & Co KG, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: tebukonazolas 250 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Dirgina odą.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)

Specialiosios saugos frazės:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 10 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, varpų septoriozės, varpų fuzariozės, lapų septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės, miltligės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, juodligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo fomozės, baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėligės, pilkojo puvinio, netikrosios miltligės (iš dalies efektyvus).

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.