



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL HERBICIDO *STOMP CS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

2012 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-343

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsnio 1 dalimi, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127) ir *Stomp CS* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Stomp CS*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. liepos 31 d.

Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 455 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti garų.

Vengti patekimo ant odos.

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žolėmis / daugiamečiais augalais, iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

Herbicidas naudojamas:

Kukurūzams.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po kukurūzų sėjos, iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams ir žirnių-javų mišiniams.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos, prieš žirnių ir žirnių-javų mišinių sudygimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pupoms.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos, prieš pupų sudygimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams su dobilų, liucernos arba varpinių žolių įsėliais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0-2,0 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucerna, ne daugiau kaip 1 kartą.

Dobilų, liucernos arba varpinių žolių pasėliams.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0-2,0 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucerna, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams su raudonųjų dobilų įsėliais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 2,0 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai dobilai turi 1–2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams su liucernos, baltųjų dobilų įsėliais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai liucerna ar dobilai turi 1–2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudoniesiems, baltiesiems dobilams, liucernai sėklai sėjos metais.

Norma: 0,88 l/ha + *Basagran 480* 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti anksti pavasarį, kai piktžolės turi 1–2 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Bulvėms.

Norma: 2,9–4,35 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti po paskutinio kaupimo, akėjimo, ne vėliau kaip 7 dienos iki bulvių sudygimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, česnakams, auginamiems iš sėklų.

Norma: 2,18–3,6 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos, prieš sudygimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, česnakams, sodinamiems iš sėklinių ropelių.

Norma: 2,18–3,6 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti prieš ropelių išsodinimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Porams, auginamiems iš sėklų.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sėjos, iki sudygimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Morkoms, šakninēms petražolēms.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti tuoj po sējos, iki sudygimo ne daugiau kaip 1 kartā.

Gūžiniam kopūstams.

Norma: 2,9 l/ha.

Naikina vienametes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.

Purkšti prieš kopūstū daigū išsodinimā ne daugiau kaip 1 kartā.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas