



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. RUGPJŪČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-445  
„DĖL FUNGICIDO *ELATUS ERA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2019 m. gegužės 15 d. Nr. A1-346  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdamas į Syngenta Polska Sp. z o.o. 2019 m. kovo 20 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. A1-445 „Dėl fungicido *Elatus Era* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, speltoms.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo kviečių dryžligės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų fuzariozės.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, ramularijos.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo kviečių dryžligės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas