



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *RUBRIC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2013 m. spalio 18 d. Nr. A1-349  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Rubric* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Rubric*, Cheminova A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

Veiklioji medžiaga: epoksikonazolas 125 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žiemiems ir vasariems kviečiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, kviečių dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žiemiems ir vasariems miežiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žiemiems ir vasariems kvietrugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo varpų septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, kviečių dryžligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žiemiems rugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Avižoms.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Cukriniams runkeliams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo baltulių, rudmargės, miltligės, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas