



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009 M.
GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-239 „DĖL FUNGICIDO *DITHANE NT*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 19 d. Nr. A1-361
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-239 „Dėl fungicido *Dithane NT* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *DITHANE NT* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. spalio 8 d. protokole Nr. AS1-5, 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į mankocebo liekanų vertinimo išvadas, atsižvelgdamas į *Dithane NT* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir atsižvelgdamas į Indofil Industries Limited 2015 m. gegužės 4 d. paraišką,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Dithane NT*, Indofil Industries Limited, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: mankocebas 750 g/kg

Fungicido forma: vandenyje disperguojančios granulės

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti dulkių / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną purškiant sėklavaisius, kaulavaisius ir vaiskrūmius, 5 metrų apsaugos zoną purškiant šakniagumbines ir svogūnines daržoves ir 3 metrų apsaugos zoną purškiant kitus augalus iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo bulvių maro ir sausligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip

7 d.

Ropiniams svogūnams, Shallot svogūnams, česnakams.

Norma: 2,5 kg/ha

Saugo nuo netikrosios miltligės, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Porams.

Norma: 2,5 kg/ha

Saugo nuo fitoftorozės, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Morkoms, pastarnokams.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo alternariozės (juodosios dėmėtligės).

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žiediniams kopūstams, brokoliams.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo netikrosios miltligės, alternariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Žieminiams kviečiams.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo lapų septoriozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 d.

Obelims, kriaušėms.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo rauplių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Slyvoms, vyšnioms.

Norma: 2,0 kg/ha

Saugo nuo slyvų rūdžių, rudojo vaisių puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 2,13 kg/ha

Saugo nuo degulių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Pupoms (*Dithane NT* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 1,5 kg/ha

Saugo nuo askochitozės, degulių, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Žirniams (*Dithane NT* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 1,0 kg/ha

Saugo nuo askochitozės, degulių, šakninio puvinio, netikrosios miltligės, diegavirtės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas