



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKymo NR. A1-337 „DĖL  
INSEKTICIDO *ENVIDOR* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2016 m. birželio 9 d. Nr. A1-361  
Vilnius

Pakeičiu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. A1-337 „Dėl insekticido *Envidor* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL INSEKTICIDO *ENVIDOR* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinancio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40 straipsnio 1 dalies a punktu (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), atsižvelgdamas į *Envidor* registracijos ataskaitos išvadas ir į 2016 m. birželio 6 d. Bayer Crop Science AG paraišką:

1. Įregistruoju insekticidą *Envidor*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2021 m. liepos 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: spirodiklofenas 240 g/l.

1.2. Insekticido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną purškiant vaismedžius, vaiskrūmius ir dekoratyvinius augalus iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną purškiant vaismedžius, 5 metrų apsaugos zoną purškiant vaiskrūmius ir dekoratyvinius augalus iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu.

Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių / sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo.

1.4. Pakuotė: 1 l.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Obelims.

Norma: 0,2 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,2 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes, raudonąsias sodines erkes, rusvąsias sodines erkes.

Purkšti nuo žiedynų formavimosi pradžios iki žiedpumpurių rausvėjimo pradžios (BBCH 51–57) arba nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.

Kriaušėms.

Norma: 0,2 l/ha purškiant 1 metro lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,2 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes, raudonąsias sodines erkes, rusvąsias sodines erkes, kriaušines blakutes.

Purkšti nuo žiedynų formavimosi pradžios iki žiedpumpurių rausvėjimo pradžios (BBCH 51–57) arba nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.

Braškėms.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes.

Purkšti prieš žydėjimą (BBCH 49–59) arba po derliaus nuėmimo (BBCH >91) ne daugiau kaip 1 kartą.

Dekoratyviems augalams, išskyrus rožes.

Norma: 0,2–0,4 l/ha.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes, raudonąsias sodines erkes.

Purkšti prieš žydėjimą arba iš karto po žydėjimo ne daugiau kaip 2 kartus, pirmą kartą 0,4 l/ha, antrą kartą – 0,2 l/ha.

Pastaba: didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.

Serbentams (*Envidor* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes, serbentines erkutes.

Purkšti vaisių augimo metu nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Šilauogėms (*Envidor* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes

Purkšti vaisių augimo metu nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Avietėms, gervuogėms (*Envidor* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes

Purkšti prieš žydėjimą (BBCH <60) arba po derliaus nuėmimo (BBCH >91) ne daugiau kaip 1 kartą.

Persikams, abrikosams (*Envidor* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,4 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,4 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes, raudonąsias sodines erkes.

Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Pastaba: didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.

Slyvoms (*Envidor* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,4 l/ha purškiant 1 m lajos aukščio medžius. Purškiant aukštesnius medžius 0,4 l/ha normą reikia dauginti iš medžio lajos aukščio.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes, raudonąsias sodines erkes, slyvines erkes, gumbadares erkes.

Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki vaisiaus brandos vidurio (BBCH 69–85) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Pastaba: didžiausia produkto norma per auginimo sezoną negali viršyti 0,6 l/ha.

Agurkams, pomidorams, auginamiems šiltnamiuose (*Envidor* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,24–0,48 l/ha.

Naikina paprastąsias voratinklines erkes.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus 3 dienoms.

Pastaba: 0,24 l/ha normą naudoti 50 cm augalams, 0,36 l/ha – 50–125 cm augalams, 0,48 l/ha – > 125 cm augalams.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas