



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *CARIBOU 50 WG* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. gegužės 19 d. Nr. A1- 362
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Caribou 50 WG* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Caribou 50 WG*, DuPont Finland Ltd, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Veikliosios medžiagos: triflusulfuronmetilas 500 g/kg.

Herbicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro - iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Pakuotė: 120 g.

Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Norma: 10 – 30 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga.

Purkšti per 2-3 kartus: pirmą kartą - kai sudygę 90 proc. runkelių ar burokėlių, o piktžolės yra skilčialapių tarpsnio, antrą ir trečią kartą - sudygus naujoms piktžolėms, kai jos yra skilčialapių tarpsnio.

Pastaba: Didžiausia norma per sezoną 90 g/ha.

Cikorijoms.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Norma: 10-30 g/ha.

Purkšti: pirmą kartą - kai sudygę 90 proc. cikorių, o piktžolės yra skilčialapių tarpsnio, antrą kartą - sudygus naujoms piktžolėms, kai jos yra skilčialapių tarpsnio.

Pastaba: Didžiausia norma per sezoną 60 g/ha.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis