



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. A1-57 „DĖL  
FUNGICIDO *EFILOR* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI”  
PAKEITIMO**

2014 m. spalio 23 d. Nr. A1-378  
Vilnius

Pakeičiu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. A1-57 „Dėl fungicido *Efilor* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *EFILOR* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. vasario 2 d. protokole Nr. AS1-1 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į pateiktos informacijos dėl *Efilor* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548 bei 1999/45 ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 vertinimo išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Efilor*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

Veikliosios medžiagos: boskalidas 133 g/l + metkonazolas 60 g/l

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono su 2-metilozotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas,

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Laikyti užrakintą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,7–1,0 l/ha

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, baltojo (sklerotinio) puvinio, pilkojo kekerinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas