



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-81 „DĖL  
FUNGICIDO *VIVERDA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2014 m. spalio 23 d. Nr. A1-379  
Vilnius

Pakeičiu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. A1-81 „Dėl fungicido *Viverda* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *VIVERDA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. kovo 15 d. protokole Nr. AS1-2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į pateiktos informacijos dėl *Viverda* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548 bei 1999/45 ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 vertinimo išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Viverda*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: boskalidas 140 g/l + epoksikonazolas 50 g/l + piraklostrobinas 60 g/l

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti užrakintą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,25 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms,

arba

Norma: 2,5 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,25 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms,

arba

Norma: 2,5 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų rūdžių, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,25 l/ha.

Saugo nuo rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms,

arba

Norma: 2,5 l/ha

Saugo nuo rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,25 l/ha

Saugo nuo smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramuliarijos, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms,

arba

Saugo nuo smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramuliarijos, stiebalūžės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas