



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M. SAUSIO
26 D. ĮSAKYMO NR. A1-017 „DĖL INSEKTICIDO *PROTEUS 110 OD* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 21 d. Nr. A1-382
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. A1-017 „Dėl insekticido *Proteus 110 OD* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *PROTEUS OD* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. sausio 16 d. protokole Nr. 1 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į tiakloprido ir deltametrino liekanų vertinimo išvadas, atsižvelgdamas į *Proteus OD* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas ir atsižvelgdamas į Bayer Crop Science 2015 m. balandžio 3 d. paraišką,

į r e g i s t r u o j u insekticidą *Proteus OD*, Bayer Crop Science, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: tiaklopridas 100 g/l + deltametrinas 10 g/l

Insekticido forma: aliejinė koncentruota suspensija

Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 25 l

Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams ir vasariniams kvietrugiams, rugiams, avižoms.

Norma: 0,6–0,75 l/ha

Saugo nuo amarų, lemu, tripsų, javinių pjūklelių, balninių gumbauodžių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Bulvėms.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo kolorado vabalų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Bulvėms.

Norma: 0,6–0,75 l/ha

Saugo nuo amarų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,6–0,75 l/ha

Saugo nuo rapsinių žiedinukų, paslėptastraublių, ankštarinių gumbauodžių, spragių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Kukurūzams.

Norma: 0,75 l/ha

Saugo nuo kukurūzinių ugniukų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Gūžiniams ir žiediniams kopūstams, brokoliams, griežčiams.

Norma: 0,75 l/ha

Saugo nuo amarų, kopūstinių kandžių, baltukų, kopūstinių pelėdgalvių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, valgomiesiems burokėliams.

Norma: 0,75 l/ha

Saugo nuo amarų, runkelinių musių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Briuseliniams kopūstams (*Proteus OD* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha

Saugo nuo amarų, kopūstinių kandžių, baltukų, kopūstinių pelėdgalvių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Pupoms (*Proteus OD* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha

Saugo nuo amarų, žirinių vaisėdžių, gumbelinių straubliukų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Žirniams.

Norma: 0,75 l/ha

Saugo nuo amarų, žirinių vaisėdžių, gumbelinių straubliukų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Morkoms (*Proteus OD* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha

Saugo nuo amarų, morkinių musių, morkinių blakučių.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Avietėms (*Proteus OD* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,75 l/ha

Saugo nuo amarų.

Purkšti pasirodžius kenkėjams ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas