



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.
GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR.A1-316 „DĖL HERBICIDO *GLYFOS SUPREME 450 SL*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. gegužės 21 d. Nr. A1-383
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. A1-316 „Dėl herbicido *Glyfos supreme 450 SL* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL HERBICIDO *GLYFOS SUPREME 450 SL* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. lapkričio 27 d. d. protokole Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Glyfos supreme 450 SL* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL, 2008 L 353, p.1) išvadas ir 2015 m. gegužės 19 d. *Cheminova A/S* paraišką,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Glyfos supreme 450 SL*, *Cheminova A/S* profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 450 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus .

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą .

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną purškiant laukuose ir 5 metrų apsaugos zoną purškiant miškuose iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro-iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l; 5 l; 10 l, 15 l, 20 l; 200 l, 1 000 l.

1 000 litrų pakuotės skirtos tik naudojantiems didelį šio herbicido kiekį.

Herbicidas naudojamas:

Žiemiems ir vasariniams kviečiams ir miežiams.

Norma: 2,4 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc. ne daugiau kaip 1 kartą iki derlaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Pastaba. Nenaudoti sėkliniams varpinių javų pasėliams.

Žirniams.

Norma: 2,4 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai paruduoja 75 proc. anksčių ne daugiau kaip 1 kartą iki derlaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams.

Lubinams.

Norma: 2,4–3,2 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai paruduoja 75 proc. anksčių ne daugiau kaip 1 kartą iki derlaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių lubinų pasėliams.

Linams.

Norma: 2,4–3,2 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pasėliai purškiami, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc. ne daugiau kaip 1 kartą iki derlaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 d.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių linų pasėliams.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 2,4–3,2 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc. ne daugiau kaip 1 kartą iki derlaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliams.

Pūdymams, dirvonams.

Norma: 2,4–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Plotams, skirtiems žemės ūkio augalams sėti ar sodinti.

Norma: 2,4–3,2 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 2,4–3,2 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,4–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. 1–2 metų soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga.

Juodųjų ir raudonųjų serbentų pokrūmiams (registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p.1) 51 straipsnį).

Norma: 2,4–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Saugoti, kad herbicidas nepatektų ant serbentų.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 2,4–4,6 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,4–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 2,4–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti tik vieną kartą birželio–rugpjūčio mėn. augalų vegetacijos metu antžemine aparatūra.

Miškų ūkyje viržiams naikinti.

Norma: 3,2–4,8 l/ha.

Mažesniąją normą naudoti viržiams naikinti, kurie auga dirvoje, turinčioje mažai organinių medžiagų, o didesniąją – dirvožemyje, kurio sudėtyje yra daug mineralinių medžiagų.

Purkšti antžemine aparatūra vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 2,4–3,2 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui antžemine aparatūra ne daugiau kaip 1 kartą.

Minkštųjų lapuočių kelmams.

Norma: 1 dalis Glyphos supreme 450 SL ir 4 dalys vandens (1:4).

Birželio–rugpjūčio mėn. nupjovus medį, kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami.“