



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.
GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. A1-307 „DĖL INSEKTICIDO *DECIS MEGA 50 EW*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2015 m. gegužės 25 d. Nr. A1-388
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. A1-307 „Dėl insekticido *Decis Mega 50 EW* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *DECIS MEGA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. lapkričio 27 d. protokole Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Decis Mega* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u insekticidą *Decis Mega*, Bayer Crop Science, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: deltametrinas 50 g/l

Insekticido forma: vandens emulsija

Insekticidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Toksiškas prarijus.

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, naudojant didžiausią registruotą normą būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant žemės ūkio augalus ir 40 metrų apsaugos zoną purškiant sodo augalus iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, naudojant didžiausią registruotą normą būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant žemės ūkio augalus ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant sodo augalus iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu.

Pakuotė: 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 200 l

Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams ir vasariniams kvietrugiams, rugiams, avižoms.

Norma: 0,125–0,15 l/ha

Naikina tripsus, lemus, pjūklelius, balninius gumbauodžius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams ir vasariniams kvietrugiams, rugiams, avižoms.

Norma: 0,15 l/ha

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Žirniams, pupoms.

Norma: 0,15 l/ha

Naikina žirninius amarus, pupinius amarus, žirninius vaisėdžius, gumbelinius straubliukus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,125–0,15 l/ha

Naikina rapsinius žiedinukus, ankštarinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius, sprages.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Bulvėms.

Norma: 0,1–0,15 l/ha

Naikina kolorado vabalus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Maistinėms bulvėms.

Norma: 0,15 l/ha

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 d.

Gūžiniams ir žiediniams kopūstams, brokoliams, griežčiams.

Norma: 0,125–0,15 l/ha

Naikina baltukus, kryžmažiedes sprages, kopūstinius pelėdgalvius, amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.

Morkoms.

Norma: 0,15 l/ha

Naikina morkines muses.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Dekoratyviems augalams.

Norma: 0,15 l/ha (0,015 proc.)

Naikina cikadeles.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

Dekoratyviems augalams.

Norma: 0,25 l/ha (0,025 proc.)

Naikina amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.

Obelims, kriaušėms.

Norma: 0,15–0,25 l/ha (0,015-0,025 proc.)

Naikina amarus, lapsukius, obelinius žiedgraužius, obuolinius vaisėdžius, pjūklelius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas