



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *XEMIMUM* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2011 m. gruodžio 19 d. Nr. A1- 392
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. gruodžio 8 d. protokole Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Xemium*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui 3 metų laikotarpiui.

Veiklioji medžiaga: fluksapiroksadas 62,5 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių ir kviečių dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, miltligės ir ramuliarijos.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams rugiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės ir rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės, lapų ir varpų septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Avižoms.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių ir miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas