



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *ADEXAR* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2012 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-396
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127) ir *Adexar* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Adexar*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

Veiklioji medžiaga: fluksapiroksadas 62,5 g/l + epoksikonazolas 62,5 g/l

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas prarijus.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis, kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti užrakintą.

Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais iki paviršinio vandens telkinių

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam kviečiam, žieminiam kvietrugiam.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, miltligės, stiebalūžės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam kviečiam, žieminiam kvietrugiam.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, miltligės, stiebalūžės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam rugiam.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo geltonųjų ir rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės, stiebalūžės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo geltonųjų ir rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės, stiebalūžės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams miežiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo geltonųjų ir rudųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramularijos, miltligės, stiebalūžės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams miežiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo geltonųjų ir rudųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramularijos, miltligės, stiebalūžės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Vasariniams miežiams.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo geltonųjų ir rudųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramuliarijos, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Vasariniams miežiams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo geltonųjų ir rudųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramuliarijos, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas