



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-141 „DĖL
FUNGICIDO *PICTOR ACTIVE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2019 m. birželio 21 d. Nr. A1-411
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, atsižvelgdamas į BASF 2019 m. balandžio 24 d. prašymą ir į *Pictor Active* registracijos ataskaitos išvadas:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. A1-141 „Dėl fungicido *Pictor Active* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 2 kartus.

Pupoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rūdžių, rudosios (šokoladinės) dėmėtligės, iš dalies saugo nuo kekerinio (pilkojo) puvinio.

Purkšti nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matomi pirmi butonai, iki 50 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 51–75), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo rūdžių, rudosios (šokoladinės) dėmėtligės, iš dalies saugo nuo kekerinio (pilkojo) puvinio.

Purkšti nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matomi pirmi butonai, iki 50 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 51–75), ne daugiau kaip 2 kartus.

Žirniams, auginamiems grūdams.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rūdžių, iš dalies saugo nuo kekerinio (pilkojo) puvinio.

Purkšti nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matomi pirmi butonai, iki 50 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 51–75), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo rūdžių, iš dalies saugo nuo kekerinio (pilkojo) puvinio.

Purkšti nuo žiedynų pasirodymo, kai lapų išorinėje pusėje matomi pirmi butonai, iki 50 proc. ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 51–75), ne daugiau kaip 2 kartus.

Žieminiams ir vasariniams rapsukams, baltosioms ir juodosioms garstyčioms, pluoštiniais ir sėmeniniams linams, daržinėms aguonoms, aliejiniams ridikams (*Pictor Active* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, alternariozės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, alternariozės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 2 kartus.

Pluoštiniais ir sėmeniniams linams (*Pictor Active* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Saugo nuo fomezės, alternariozės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 1 kartą;
arba

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo fomezės, alternariozės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 2 kartus.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas