



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *CAPALO* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2014 m. lapkričio 21 d. Nr. A1-431
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Capalo* registracijos ataskaitos išvadomis,

perregistruoju fungicidą *Capalo*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 62,5 g/l + fenpropimorfas 200 g/l + metrafenonas 75 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema).

Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2000 l rezervuaro talpas vandeniui ir užgriebio plotį nuo 18 metrų.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 50 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniams kviečiams.

Saugo nuo kviečių dryžligės, lapų ir varpų septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, stiebalūžės.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, arba

Norma: 1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniams miežiams.

Saugo nuo smulkiųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, miltligės, stiebalūžės.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms arba

Norma: 1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam rugiams.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, stiebalūžės.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Saugo nuo miltligės, vainikuotųjų rūdžių.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Direktorius

Sergejus Fedotovas