



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *DUETT ULTRA* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2014 m. lapkričio 21 d. Nr. A1-434
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Duett ultra* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Duett ultra*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. spalio 31 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 187 g/l + tiofanat metilas 310g/l

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas įkvėpus.

Kenksmingas prarijus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra tiofanatmetilo ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono su 2-metilizotiazol-3(2H)-onu.

Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Saugo nuo miltligės, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, stiebalūžės.

Norma: 0,6 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, arba

Norma: 0,3 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo miltligės, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, stiebalūžės.

Norma: 0,6 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, arba

Norma: 0,3 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, rudadėmės dryžligės (dalinis poveikis).

Norma: 0,6 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, arba

Norma: 0,3 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, stiebalūžės.

Norma: 0,6 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, arba

Norma: 0,3 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Direktorius

Sergejus Fedotovas