



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-311 „DĖL
FUNGICIDO *OPUS* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr. A1-435
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. A1-311 „Dėl fungicido *Opus* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *OPUS* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdama į BASF A/S 2018 m. liepos 12 d. prašymą:

1. A t n a u j i n u fungicido *Opus*, BASF UAB, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: epoksikonazolas 125 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas, jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Dirgina odą.

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazės:

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono su 2-metilizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių.

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniam miežiui.

Saugo nuo smulkiųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, ramuliarijos, miežių septoriozės, miltligės.

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniam kvietrugiui.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam rugiui.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių, miltligės.

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

2. P a n a i k i n u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. rugsėjo 22 d. išduoto registracijos liudijimo Nr. AS2-35F/2014 galiojimą.

3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

4. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė