



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *TRIMMER 500 WG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. vasario 3 d. Nr. A1-43

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Trimmer 500 WG* registracijos ataskaitos išvadamis,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Trimmer 500 WG*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. spalio 31 d.

Veiklioji medžiaga: tribenuron metilas 500 g/kg.

Herbicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l didelio tankio polietileno (DTPE) buteliai.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams kvietrugiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, žieminiams rugiams.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Norma: 15–22,5 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga

Purkšti pavasarį, kai javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Direktorius

Sergejus Fedotovas