



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *KARATE SPRAY* ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2017 m. rugpjūčio 7 d. Nr. A1-442
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinamo Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L309, p. 1) 40 straipsnio 1 dalies b punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Karate Spray* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju insekticidą *Karate Spray*, Syngenta Polska Sp. z o.o., neprofesionaliajam naudojimui iki 2018m. liepos 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: lambda-cihalotrinas 0,015 g/l.

1.2. Insekticido forma: mikrokapsulių emulsija, paruošta naudoti.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant daržoves, vaiskrūmius, dekoratyvinius augalus ir 10 metrų apsaugos zoną purškiant medžius.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

1.4. Pakuotė: 1 l.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina kolorado vabalus, amarus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Morkoms, pastarnokams, ropėms.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina morkines blakutes, muses, amarus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Burokėliams.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina runkelines muses, amarus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Salierams.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina morkines blakutes, muses, amarus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Ridikėliams.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina kryžmažiedines sprages.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Pomidorams lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina šiltnaminius baltasparnius, amarus, kandis, paprastąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Baklažanams šiltnamiuose.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina šiltnaminius baltasparnius, amarus, kandis, paprastąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Paprikoms šiltnamiuose.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina šiltnaminius baltasparnius, amarus, paprastąsias voratinklines erkes.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Agurkams, cukinijoms lauke.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina tripsus, amarus, kandis.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 5 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Agurkams, cukinijoms šiltnamiuose.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina šiltnaminius baltasparnius, tripsus, amarus, kandis.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Gūžiniams, žiediniams, briuseliniais kopūstams.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina kopūstinius baltukus, kandis, amarus.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Salotoms.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina tripsus, amarus, kandis.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Pupoms.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina gumbelinius straubliukus, pupinius amarus, tripsus, žirnius vaisėdžius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Žirniams.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina gumbelinius straubliukus, žirinius amarus, tripsus, žirninius vaisėdžius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Braškėms, vynuogėms.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina paprastąsias voratinklines erkes, amarus, pjūklelius, lapsukius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Juodiesiems serbentams, raudoniesiems serbentams, agrastams.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina paprastąsias voratinklines erkes, amarus, pjūklelius, lapsukius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Avietėms, gervuogėms.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina paprastąsias voratinklines erkes, amarus, pjūklelius, lapsukius.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

Dekoratyviems augalams.

Norma: 300–1000 ml/10 m².

Naikina amarus, blakes, erkutes, cikadeles.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus.

Pastaba: purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas