



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS 2012 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKIMO NR. A1-181 „DĖL FUNGICIDO
PROPULSE ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2014 m. lapkričio 28 d. Nr. A1-450
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl fungicido *Propulse* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL FUNGICIDO *PROPULSE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. birželio 7 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Propulse* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Propulse*, Bayer CropScience AG, profesionaliajam naudojimui iki 2015 m. birželio 18 d.

Veikliosios medžiagos: fluopiramas 125 g/l + protiokonazolas 125 g/l

Fungicido forma: suspoemulsija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali pakenkti kepenims, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono ir 2-[2-(1-chlorciklopropil)-2-hidroksi-3-fenilpropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėligės, pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas