



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A1-513
„DĖL FUNGICIDO *TANGO SUPER* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2018 m. rugpjūčio 20 d. Nr. A1- 456
Vilnius

1. Pakeičiu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. A1-513 „Dėl fungicido *Tango Super* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *TANGO SUPER* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdama į BASF A/S 2018 m. liepos 12 d. prašymą:

1. Atnaujinu fungicido *Tango Super*, BASF UAB, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 84 g/l + fenpropimorfis 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: suspoemulsija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazės:

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono su 2-metilizotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema).

Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2000 l rezervuaro talpyklas vandeniui ir didesnę nei 18 metrų užgriebio plotį.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniam kviečiams.

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, lapų ir varpų septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.

Norma: 1,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 0,75 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniam kvietrugiam.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, miltligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniam miežiui.

Saugo nuo dryžligės, miltligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam rugiui.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Saugo nuo miltligės.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.“

2. P a n a i k i n u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. gruodžio 29 d. išduoto registracijos liudijimo Nr. AS2-49F/2014 galiojimą.

3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

4. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė