



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL BEICO *MAXIM STAR 025 FS* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2015 m. birželio 11 d. Nr. A1-459

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Maxim Star 025 FS* registracijos ataskaitos išvadomis,

a t n a u j i n u beico *Maxim Star 025 FS*, Syngenta Polska Sp. z o. o., registraciją, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. spalio 31 d.

Veikliosios medžiagos: fludijoksonilas 18,75 g/l + ciprokonazolas 6,25 g/l

Beico forma: takus koncentratas sėklų beicavimui

Beicas klasifikuojamas:

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos taip pat būtų visiškai įterptos vagų gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

Pakuotė: 5 l, 220 l

Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0–1,5 l/t

Saugo nuo *Fusarium spp.* *Cochliobolus sativus* sukeltų daigų pašaknio ligų, dulkančiųjų kūlių, pavasarinio pelėsio, kietųjų kūlių, daigų septoriozės, miltligės ankstyvaisiais vystymosi tarpsniais.

Beicuojama naudojant 8–10 l tirpalo 1 tonai grūdų.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t

Saugo nuo *Fusarium spp.* *Cochliobolus sativus* sukeltų daigų pašaknio ligų, dulkančiųjų kūlių, kietųjų kūlių, dryžligės ir miltligės ankstyvaisiais vystymosi tarpsniais.

Beicuojama naudojant 8–10 l tirpalo 1 tonai grūdų.

Pluoštiniais linams.

Norma: 1,5 l/t

Saugo nuo vytulių, degulių, pasmos.

Beicuojama naudojant 8–10 l tirpalo 1 tonai grūdų.

Direktorius

Sergejus Fedotovas