



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *OSIRIS* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2015 m. vasario 3 d. Nr. A1-45
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Osiris* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Osiris*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 37,5 g/l + metkonazolas 27,5 g/l

Fungicido forma: koncentruota emulsija

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l, 10 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, kviečių dryžligės, miltligės, varpų fuzariozės.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, arba

Norma: 1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, kviečių dryžligės, miltligės, varpų fuzariozės.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Saugo nuo smulkiųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, arba

Norma: 1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, milltligės, rinchosporiozės.

Norma: 2,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Direktorius

Sergejus Fedotovas