



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *BUTISAN AVANT* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. A1-460  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Butisan Avant* registracijos ataskaitos išvadomis:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Butisan Avant*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. spalio 31 d.

Veikliosios medžiagos: metazachloras 300 g/l + dimetenamidas-P 100 g/l + kvinmerakas 100 g/l

Herbicido forma: suspoemulsija

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro, dimetenamido-P, kvinmerako, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

Herbicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniam rapsams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha

Naikina vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti iki sudygimo (BBCH 00–09) arba rapsams sudygus (BBCH 10–14) ne daugiau kaip 1 kartą.

2. R e k o m e n d u o j u Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos įtraukti metazachlorą ir jo metabolitus į Valstybinę aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programą.

Direktorius

Sergejus Fedotovas