



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *BRUTUS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2017 m. rugsėjo 5 d. Nr. A1-485  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į BASF A/S 2017 m. rugpjūčio 14 d. paraišką:

1. Įregistruoju fungicidą *Brutus*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 37,5 g/l + metkonazolas 27,5 g/l.

Fungicido forma: koncentruota emulsija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu poveikis numanomas: kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l, 10 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, kviečių dryžligės, miltligės, varpų fuzariozės.

Norma: 2,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo lapų septoriozės, varpų septoriozės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, kviečių dryžligės, miltligės, varpų fuzariozės.

Norma: 2,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Saugo nuo smulkiųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 2,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms;

arba

Norma: 1,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiam rugiams.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Norma: 2,0 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas