



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL FUNGICIDO *REVYTTREX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

2019 m. rugpjūčio 9 d. Nr. A1-498
Vilnius

1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinancio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/605 (OL 2018 L 101, p. 33), 33 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdama į *Revyttrex* registracijos ataskaitos išvadas:

1.1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Revyttrex*, BASF UAB, profesionaliajam naudojimui iki 2023 metų gruodžio 31 d.:

1.1.1. Veikliosios medžiagos – mefentriflukonazolas 66,7 g/l + fluksapiroksadas 66,7 g/l;

1.1.2. Fungicido forma – koncentruota emulsija;

1.1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1), klasifikuojamas ir ženkliriamas jam priskiriant:

1.1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.

1.1.3.2. Pavojingumo frazės:

Smarkiai pažeidžia akis.

Dirgina odą.

Kenksmingas įkvėpus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.1.3.3. Atsargumo frazes:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Neįkvėpti rūko ar garų.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno vietas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikyti užrakintą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.1.4. Pakuotės: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l.

1.1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms: purškiant vieną kartą – 1,5 l/ha; purškiant per du kartus – po 0,75 l/ha.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžia iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms: purškiant vieną kartą – 1,5 l/ha; purškiant per du kartus – po 0,75 l/ha.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, ramularijos, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžia iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, ne daugiau kaip vieną kartą.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžia iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, ne daugiau kaip vieną kartą.

Avižoms.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Saugo nuo avižų dryžligės.

Purkšti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblių pradžia iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms, ne daugiau kaip vieną kartą.

1.2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė