



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *MERIT FOREST* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. liepos 7 d. Nr. A1-503
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Merit Forest* registracijos ataskaitos išvadamis,

į r e g i s t r u o j u insekticidą *Merit Forest*, Bayer AB, profesionaliajam naudojimui iki 2020 liepos 31 d.

Veiklioji medžiaga: imidaklopridas 700 g/kg

Insekticido forma: vandenyje dispersiškos granulės

Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksminga prarijus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai augalai yra padengti lipčiumi, kuris pritraukia bites.

Pakuotė: 2 kg.

Insekticidas naudojamas:

Eglių, pušų, maumedžių sodinukams.

Norma: 175 g/ha.

Saugo nuo didžiojo pušinio straubliuko, eglinio šakniagraužio, didžiojo pušinio šakniagraužio.

Prieš sodinimą šaknų sistemą apdoroti naudojant uždara sistemą 5 ml 1,4 proc. tirpalo sodinukui, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti daugiau kaip 2500 vnt. sodinukų į hektarą.

arba

Eglių, pušų, maumedžių sodinukams.

Norma: 175 g/ha.

Saugo nuo didžiojo pušinio straubliuko, eglinio šakniagraužio, didžiojo pušinio šakniagraužio.

Prieš sodinimą šaknų sistemą apdoroti mirkant / panardinant apatinę sodinuko dalį į 10 ml 0,7 proc. tirpalo sodinukui arba 20 ml 0,35 proc. tirpalo sodinukui, ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnę tirpalo kiekį naudoti mažesnių matmenų medeliams, didesnę kiekį naudoti didesnių matmenų medeliams.

Pastaba: Nenaudoti daugiau kaip 2500 vnt. sodinukų į hektarą.

2–3 metų eglių, pušų, maumedžių sodinukams.

Norma: 70–100 g/ha.

Saugo nuo didžiojo pušinio straubliuko, eglinio šakniagraužio, didžiojo pušinio šakniagraužio.

Purkšti apatinę stiebo dalį 2 ml 1,4–2 proc. tirpalo sodinukui arba 10 ml 0,28–0,4 proc. tirpalo sodinukui, ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnę tirpalo kiekį naudoti mažesnių matmenų medeliams, didesnę kiekį naudoti didesnių matmenų medeliams.

Pastaba: Nenaudoti daugiau kaip 2500 vnt. sodinukų į hektarą.