



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL AUGIMO REGULIATORIAUS *MOXA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2016 m rugpjūčio 30 d. Nr. A1-506
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Moxa* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju augimo reguliatorių *Moxa*, Globachem NV, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: trineksapak etilas 250 g/l.

1.2. Augimo reguliatoriaus forma: koncentruota emulsija.

1.3. Augimo reguliatorius klasifikuojamas:

Atsargiai.

Degus skystis ir garai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga įkvėpus.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.

Stengtis neįkvėpti garų / rūko / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Augimo reguliatorius naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,2–0,4 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,15 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 2 kartus.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,4–0,6 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,3 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 2 kartus.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,5–0,6 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,25 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 2 kartus.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,4–0,6 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,25 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39) ne daugiau kaip 2 kartus.

Avižoms.

Norma: 0,3 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki antras bamblys pakyla daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25–32) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Avižoms.

Norma: 0,15 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki antras bamblys pakyla daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25–32) ne daugiau kaip 2 kartus.

Varpinėms žolėms (tikriesiems eraičinams, raudoniesiems eraičinams, daugiametėms svidrėms, pašariniams motiejukams), sėklai.

Norma: 0,4–0,8 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Varpinės žolės (tikrieji eraičiniai, raudonieji eraičiniai, daugiametės svidrės, pašariniai motiejukai) sėklai

Purkšti nuo pirmojo bamblio tarpsnio iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49) ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Varpinėms žolėms (tikriesiems eraičiniams, raudoniesiems eraičiniams, daugiametėms svidrėms, pašariniams motiejukams) sėklai.

Norma: 0,4 l/ha.

Saugo nuo išgulimo.

Purkšti nuo pirmojo bamblio tarpsnio iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49) ne daugiau kaip 2 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas