



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *TANGO FLEX SC* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. A1- 512
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Tango Flex SC* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Tango Flex SC*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 83 g/l + metrafenonas 100 g/l.

Fungicido forma: koncentruota suspensija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono su 2-metilizotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro apsaugos zoną iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

Fungicidas naudojamas:

Žiemiems ir vasariniams kviečiams.

Saugo nuo kviečių dryžligės, lapų septoriozės, miltligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, stiebalūžės.

Norma: 1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms arba

Norma: 0,75 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žiemiems ir vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo lapų septoriozės, miltligės, geltonųjų ir rudųjų, kviečių dryžligės, stiebalūžės.

Norma: 1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žiemiems ir vasariniams miežiams.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, miltligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių.

Norma: 1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms arba

Norma: 0,75 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žiemiems rugiams.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, stiebalūžės.

Norma: 1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Saugo nuo miltligės, vainikuotųjų rūdžių.

Norma: 1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Direktorius

Sergejus Fedotovas