



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *TANGO SUPER* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. A1- 513

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Tango super* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Tango super*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 84 g/l + fenpropimorfis 250 g/l.

Fungicido forma: suspoemulsija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono su 2-metilizotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema).

Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2000 l rezervuaro talpas vandeniui ir didesnę nei 18 metrų užgriebio plotį.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l

Fungicidas naudojamas:

Žiemiems ir vasariniams kviečiams.

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, lapų ir varpų septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių.

Norma: 1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms arba

Norma: 0,75 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žiemiems ir vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, miltligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių, kviečių dryžligės.

Norma: 0,75–1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žiemiems ir vasariniams miežiams.

Saugo nuo dryžligės, miltligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių.

Norma: 0,75–1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių.

Norma: 0,75–1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Saugo nuo miltligės.

Norma: 0,75–1,5 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Direktorius

Sergejus Fedotovas