



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS 2010 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-163 „DĖL FUNGICIDO
MAREDO 125 SC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. A1- 517
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-163 „Dėl fungicido *Maredo 125 SC* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO MAREDO 125 SC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. spalio 19 d. protokole Nr. AS1-6, 2010 m. gruodžio 7 d. protokole Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Maredo 125 SC* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Maredo 125 SC*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. gruodžio 10 d.

Veiklioji medžiaga: epoksikonazolas 125 g/l

Fungicido forma: koncentruota suspensija

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas įkvėpus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, miltligės, varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Norma: 0,5–0,75 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, miltligės, varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Saugo nuo miežių septoriozės, smulkiųjų rūdžių, miltligės, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, dalinai nuo rudadėmės dryžligės, dalinai nuo ramuliarijos vasarinius miežius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

arba

Norma: 0,5–0,75 l/ha

Saugo nuo miežių septoriozės, smulkiųjų rūdžių, miltligės, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, dalinai nuo rudadėmės dryžligės, dalinai nuo ramuliarijos vasarinius miežius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,0 l/ha

Saugo nuo rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Cukriniams runkeliams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo baltulių, rudmargės, miltligės, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

arba

Norma: 0,5–0,75 l/ha.

Saugo nuo baltulių, rudmargės, miltligės, rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas