



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *FALCON FORTE* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2017 m. sausio 25 d. Nr. A1-51

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Falcon Forte* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u fungicido *Falcon Forte*, Bayer AG, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 53 g/l + spiroksaminas 224 g/l + tebukonazolas 148 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Kenksmingas prarijus ar įkvėpus.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,6–0,8 l/ha.

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,6–0,8 l/ha.

Saugo nuo miltligės, tinkliškosios dryžligės, richosporiozės, varpų septoriozės, smulkiųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,6–0,8 l/ha.

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, dryžligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,6–0,8 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas