



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL FUNGICIDO *PROLINE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

2018 m. vasario 6 d. Nr. A1-51
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinancio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1432 (OL 2017 L 205, p. 59) 40 straipsnio 1 dalies a punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Proline* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju fungicidą *Proline*, Bayer AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: protiokonazolas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Sudėtyje yra protiokonazolo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

1.4. Pakuotė: 5 l, 15 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, spelta kviečiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, kviečių dryžligės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki pradeda formotis grūdas (BBCH 30–69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, varpų fuzariozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, rinchosporiozės, geltonųjų rūdžių, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Rugiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės, miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas