



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS 2013 M. KOVO 6 D. ĮSAKIMO NR. A1-85 „DĖL FUNGICIDO *EPOX  
EXTRA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. A1-523  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. A1-85 „Dėl fungicido *EpoX Extra* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *EPOX EXTRA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), *EpoX extra* registracijos ataskaitos išvadamis ir atsižvelgdamas į *EpoX Extra* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *EpoX extra*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 50 g/l + folpetas 375 g/l

Fungicido forma: koncentruota suspensija

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Kenksmingas įkvėpus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Sudėtyje yra folpeto ir metinamino. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Pakuotė: 5 l, 10 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 2,0 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės. Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 2,0 l/ha

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, septoriozės, smulkiųjų rūdžių, miltligės, ramuliarijos.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, septoriozės, smulkiųjų rūdžių, miltligės, ramuliarijos.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 2,0 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rinchosporiozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, rinchosporiozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.“