



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS 2010 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-135 „DĖL FUNGICIDO
EPOX TOP ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. A1- 524
Vilnius

P a k e i ĉ i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. A1-135 „Dėl fungicido *EpoX Top* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL FUNGICIDO *EPOX TOP* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. rugsėjo 14 d. protokole Nr. AS1-5 ir 2010 m. spalio 19 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *EpoX Top* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *EpoX Top*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. lapkričio 9 d.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 40 g/l + fenpropidinas 100 g/l

Fungicido forma: koncentruota emulsija

Fungicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Smarkiai pažeidžia akis.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra fenpropidino, propano rūgšties (2S)-2-hidroksi-2-etilheksilo esterio ir kanifolijos. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 5 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, lapų ir varpų septoriozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms kviečių veislės, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, lapų ir varpų septoriozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės kviečių veislės, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha

Saugo nuo miltligės, tinkliškosios dryžligės, miežių septoriozės, rinchosporiozės, dalinai nuo rudadėmės dryžligės, dalinai nuo ramuliarijos vasarinius miežius.

Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms miežių veislės, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha

Saugo nuo miltligės, tinkliškosios dryžligės, miežių septoriozės, rinchosporiozės, dalinai nuo rudadėmės dryžligės, dalinai nuo ramuliarijos vasarinius miežius.

Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės miežių veislės ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 2,0–2,5 l/ha

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, lapų ir varpų septoriozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms kvietrugių veislės, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/ha

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, lapų ir varpų septoriozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės kvietrugių veislės, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.“