



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-136  
„DĖL BEICO *CELEST TRIO 060 FS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A1-551  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. A1-136 „Dėl beico *Celest Trio 060 FS* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL BEICO *CELEST TRIO 060 FS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. rugsėjo 14 d. protokole Nr. AS1-5 ir 2010 m. spalio 19 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis, ir atsižvelgdamas į *Celest Trio 060 FS* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u beičą *Celest Trio 060 FS*, Syngenta Polska Sp. z o.o., profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: fludijoksonilas 25 g/l + difenokonazolas 25 g/l + tebukonazolas 10 g/l

Beico forma: takus koncentratas sėklų beicavimui

Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos taip pat būtų visiškai įterptos vagų gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l, 220 l.

Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, daigų pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, daigų septoriozės, nykštukinių kūlių.

Beicuoti naudojant 6,0–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kviečiams

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo daigų pašaknio puvinų, daigų septoriozės, kietųjų ir dulkančiųjų kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams miežiams.

Norma: 1,5 l/t.

Saugo nuo kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, tinkliškosios dryžligės, juostuotosios dryžligės, daigų pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Vasariniams miežiams.

Norma: 1,5 – 2,0 l/t.

Saugo nuo kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, tinkliškosios dryžligės, juostuotosios dryžligės, daigų pašaknio puvinų.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams rugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo daigų pašaknio puvinių, pavasarinio pelėsio, stiebinių kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Saugo nuo daigų pašaknio puvinių, pavasarinio pelėsio.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.

Avižoms.

Norma: 1,5 l/t.

Saugo nuo dulkančių kūlių.

Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas