



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M. LIEPOS
31 D. ĮSAKYMO NR. A1-209 „DĖL INSEKTICIDO *KARATE ZEON 5 CS*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. rugpjūčio 4 d. Nr. A1-555
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. A1-209 „Dėl insekticido *Karate Zeon 5 CS* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *KARATE ZEON 5 CS* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. liepos 10 d. protokole Nr. 5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Karate Zeon 5 CS* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

a t n a u j i n u insekticido *Karate Zeon 5 CS*, Syngenta Polska Sp. z o.o., registraciją profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: lambda-cihalotrinas 50 g/l

Insekticido forma: mikrokapsulių suspensija

Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Kenksminga prarijus ir įkvėpus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną (laukams), 40 metrų (sodams), 15 metrų (vaiskrūmiams) ir 30 metrų (apyniams) iki paviršinių vandens telkinių bei 1 metro iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną (lauko pasėliams) ir 10 metrų (sodams) iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Insekticidas naudojamas:

Kviečiams.

Norma: 0,2 l/ha.

Naikina javines museles, amarus, tripsus, pjūklelius.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų.

Miežiams.

Norma: 0,15–0,2 l/ha.

Naikina amarus, javines museles, tripsus, pjūklelius.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų.

Bulvėms.

Norma: 0,1 l/ha.

Naikina kolorado vabalus.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų.

Rapsams.

Norma: 0,1–0,15 l/ha.

Naikina rapsinius žiedinukus, sprages, paslėptastraublius, amarus

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų.

Liucernai.

Norma: 0,15 l/ha.

Naikina blakes, amarus, blakutes, apionus, lapinukus.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Obelims.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina obuolinius vaisėdžius, lapsukius.

Norma: 0,6 l/ha.

Naikina erkes.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų.

Vyšnioms, avietėms.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina voratinklines erkes, amarus, lapsukius, pjūklelius.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Braškėms.

Norma: 0,5 l/ha.

Naikina voratinklines erkes, amarus, lapsukius, pjūklelius.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Serbentams.

Norma: 0,3–0,4 l/ha.

Naikina voratinklines erkes, amarus, lapsukius, pjūklelius.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Agrastams.

Norma: 0,3 l/ha.

Naikina voratinklines erkes, amarus, lapsukius, pjūklelius.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Apyniams.

Norma: 0,4 l/ha.

Naikina amarus, erkes.

Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Lapuočiams.

Norma: 0,2–0,4 l/ha.

Naikina lapus graužiančius vabzdžius, voratinklines erkes.

Negrybauti, neuogauti – 10, nedirbti miške – 1, nepoilsiauti – 4 dienas po purškimo.

Tušties sandėliams.

Norma: 0,4 ml/m².

Naikina sandėlių kenkėjus.

Apdorojama šlapiuoju būdu (200 ml tirpalo – 1m²). Praėjus 72 valandoms po apdorojimo leidžiama įeiti ir pilti grūdus.

Teritorijai apie sandėlius.

Norma: 0,8 ml/m².

Naikina sandėlių kenkėjus.

Apdorojama šlapiuoju būdu (400 ml tirpalo – 1m²).“

Direktorius

Sergejus Fedotovas